

Rucher école du Carla
81 Castelnau de Levis

**PRESENTATION FRELON
CYCLE ET PIEGEAGE**

TERSSAC 4 AVRIL 2025



Bonjour: je suis DIDIER DELPAL

-Propriétaire sur Terssac

-Retraité

-Apiculteur amateur à Rouffiac

-Administrateur au syndicat de l'abeille tarnaise

-Technicien Sanitaire au Groupement de défense sanitaire apicole du Tarn

-Formateur au rucher école du Carla ,
sur le site 1000 étoiles pour l'enfance à Castelnau de levis


Et

PHILIPPE DELATTRE

Apiculteur

Désinsectiseur guêpes frelons agréé collectivité

rucher ecole du carla 81



DECOUVREZ LE SECRET DES ABEILLES AU RUCHER ECOLE DU CARLA 81 CASTELNAU DE LEVIS



Les jardins insolites du Carla



Avec le soutien de

- La région Occitanie
- Le Conseil Départemental du Tarn
- La Communauté d'Agglomération de l'Albigeois
- La commune de Castelnau de Lévis



Réalisés et entretenus par

- Les bénévoles de l'association 1000 Étoiles pour l'Enfance
- Le foyer de vie Henri Enguilbert de Florentin (AgaPei)
- Les mécènes et donateurs privés.



les Jardins Insolites du Carla et vous propose une déambulation thématique parmi
les sculptures de Casimir Ferrer
verger, jardin japonais, vigne, pastel,
jardin des 5 sens,
rucher,
plantes aromatiques

PROGRAMME

- Le frelon à pattes jaune (frelon asiatique).
- Cycle du frelon
- Piégeage de printemps
- Piégeage d'automne et protection des ruches
- questions /réponses
- Fabrication et distribution de pièges.

REPONSES AUX QUESTIONS





- Le FA est présent du nord de l'Inde à la Chine et de la péninsule indochinoise à l'archipel indonésien.
 - Les individus de la sous-espèce introduite en France, *Vespa velutina nigrithorax*, sont supposés être **originaires de Chine**.
- Dans les pays d'Asie continentale où ils vivent, les conditions climatiques sont comparables à celles du sud de l'Europe.
- Le FA aurait été **introduit accidentellement en France en 2004 Lot-et-Garonne** via des poteries importées de Chine (Yunnan).
 - Depuis, il connaît une **croissance exponentielle** avec des conséquences non négligeables .

- **Sécurité publique :**

- La présence de nids actifs peut constituer **un réel danger** en cas d'attaques massives (très agressif)

- **Environnement :**

- Classé **espèce exotique envahissante** par le ministère de la transition écologique et solidaire (Prédateur des insectes locaux).
- **Plus de 11 Kg d'insectes dévorés par an par un nid de frelons asiatiques.**

- **Filière apicole :**

- Classé **danger sanitaire** par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation (Prédateur de l'abeille domestique (*Apis mellifera*))

Le Parlement a adopté le 6 mars 2025

une proposition de loi visant à

endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole.

- Cela rend les communes contraintes à l'action.
 - Prévention
 - Identification , repérages
 - Destruction
-
- Notez que la prévention collective par le piégeage est la moins coûteuse

Comment se protéger ?

- Ne pas s'approcher d'un nid actif,- Se tenir à distance minimale de 15 mètres du nid,
- Sensibiliser les enfants,- Inspecter périodiquement son jardin, ses massifs,...
- Contacter la mairie ou organisations apicole pour organiser la destruction du nid.

Comment réagir lors d'une attaque ?

- Rester calme,- Eviter les mouvements brusques,
- S'éloigner du nid,- Ne pas rester groupés

Que faire après une attaque ?

- Se mettre au repos,
- Si la piqûre a eu lieu sur la main, retirer montre, bagues et bracelets,
- Nettoyer la plaie à l'eau savonneuse,
- Appeler le 18 à la suite d'une attaque massive ou présence de tout symptôme évoquant un choc allergique (difficultés à respirer , démangeaisons, gonflement du visage, malaise, nausées...).



- Tête noire ;
 - Thorax brun foncé ;
- Abdomen avec des segments abdominaux bordés d'une fine bande jaune. Seul le 4ème segment de l'abdomen porte une large bande jaune-orangé.

- Description générale du nid

- Sphérique ou ovale ;
- 1 m de haut et 80 cm de diamètre quand il est fixé, comme c'est souvent le cas, à plus de 15 m de haut dans un grand arbre ;
- Construit en fibres de bois mâchées formant un papier grossier ;
 - Composé de plusieurs galettes d'alvéoles entourées d'une enveloppe faite de larges écailles de papier, striées de beige et de brun.





rucher ecole du carla 81

Fiche d'aide à l'identification

Les confusions possibles parmi les nids de guêpes

Si vous imprimez cette page sur une feuille A4, les insectes seront en taille réelle.
Plus d'informations et une fiche de signalement sur Internet <http://thelonoslatique.museo.fr>

Au printemps, chaque reine fondatrice construit seule son nid dans un lieu souvent protégé. Chez la plupart des guêpes le nid embryon ressemble à une petite sphère de 5 à 10 cm de diamètre avec une ouverture vers le bas. Chez les frelons, la colonie n'hésite pas à déménager si l'emplacement ne convient plus (manque de place, de sécurité).

Freulon asiatique à petites jaunes, *Vespa velutina*

73% arbres à plus de 10m
10% bâtiments
1% talus
sphérique à profilure
ouverture petite et latérale
~ 60x60 cm

Freulon d'Europe, *Vespa crabro*

arbres creux, cheminées
rarement adhésif
cylindrique
ouverture large vers le bas
~ 30x50 cm
OK orientalis construit
des nids sans enveloppe
lorsqu'il est dans une
cavité, grillé

Guêpe commune, *Vespa laevigata*

sol, bâtiments
confinal
conique
ouverture petite,
base cachée
~ 30x35 cm
OK germanica construit
des nids légèrement
plus grands et gris

Guêpe des buissons, *Dolichovespula media*

buissons creux de 2m
conique
ouverture petite, base
excentrée
~ 20x25 cm

•Construction d'un nid primaire :

- Généralement construit dans un endroit abrité à hauteur d'homme
- (ruche vide, cabanon, trou de mur, bord de toit, roncier...).
- L'orifice de sortie est basal.



•Construction d'un nid secondaire (avec délocalisation pour 70 % des cas) :

- Si l'environnement devient défavorable ou l'emplacement trop étroit pour la colonie en croissance ;
- Généralement à plus de 10 – 15 m de haut dans un grand arbre.
- L'orifice de sortie est petit et latéral



Nid primaire (20-30 insectes)



rucher école du carla 81

Nid secondaire (2000 – 3000 insectes)






Nid primaire – frelon européen

rucher ecole du carla 81



Nid primaire – frelon asiatique



NID DE FRELON EUROPEEN DANS UNE CABANE DE JARDIN ROUFFIAC 2024



ENTREE BASALE

Nid secondaire – frelon européen



ENTREE LATERALE

Nid secondaire – frelon asiatique


NUTRITION

- Insectivore généraliste ;
- Viande de cadavres de vertébrés (notamment poissons et crevettes exposées aux étals des marchés ou dans les ports)
- Fruits mûrs (pommes, prunes, raisins...).

Les boulettes de proies servent à nourrir les larves.

Les adultes ne se nourrissent que de liquides
sucrés (miellat, nectar, miel...)
riche en protéines que régurgitent les larves lorsqu'ils les
sollicitent.

Et la chair des fruits



- Production d'environ 13 000 individus par nid au cour d'une saison (d'avril à novembre) 5 fois plus populeux que ceux du frelon d'Europe ;
- Les descendants femelles sont issus d'œufs fécondés ;
- Les mâles sont issus d'œufs non fécondés.

La colonie n'est composée que d'ouvrières (femelles stériles) jusqu'à ce que la nouvelle génération de sexués mâles et femelles se développe au début de l'automne.

La vieille reine meurt peu de temps avant l'essaimage des sexués puis le reste de la colonie.

- Les nids vides ne sont jamais réutilisés.

Reproduction

●Période automnale (octobre à novembre) :

- Les femelles reproductrices de la nouvelle génération quittent le nid en compagnie des mâles pour s'accoupler (environ 500 futures reines par nid !).

Piégeage possible nov dec
Et mise en place protections



●Période hivernale :

- Les femelles reproductrices fécondées hivernent (le reste meurt ou est non viable).

●Période printanière (mars à juin) :

- Chaque reine fondatrice ébauche un nouveau nid, pond quelques œufs et soigne ses premières larves. La reine sort du nid pour rechercher de la nourriture

Piégeage possible
ou repérages des nids primaires



●Période estivale :

- Les ouvrières devenues adultes prennent en charge la construction du nid et l'entretien de la colonie ;
- La reine consacra alors le reste de sa vie à pondre. Avec l'apparition des ouvrières, l'activité de la colonie s'intensifie considérablement et la taille du nidaugmente pour atteindre son maximum au début de l'automne.

Si vous piègez utilisez
absolument des pièges
sélectifs et loin du
rucher ou harpes



LE FRELON ASIATIQUE ET L'ABEILLE


Le frelon asiatique est l'ennemi incontesté de nos abeilles,

- il se met en vol stationnaire devant les ruches,
- attrape et tue les abeilles arrivant ou repartant,
- puis les découpe dans un buisson voisin
- emporte que le thorax, riche en protéines pour le donner à manger à ses larves.



LE FRELON ASIATIQUE ET L'ABEILLE

Les abeilles sont stressées et hésitent à sortir des ruches, elles se massent sur le plateau d'envol pour essayer de faire face sans succès à un ennemi bien trop puissant pour elles.(elles font la barbe)



Résultat:

moins de pollen pour nourrir les larves, baisse de la production de miel, baisse de la population de la ruche, affaiblissement de celle-ci pouvant aller jusqu'à la mort de la ruche.

On a pu aussi assister a des nids de frelons asiatiques qui après avoir détruit l'essaim d'abeilles s'étaient installés dans la ruche

Modalités d'évaluation de la densité de frelons

La densité de frelons est évaluée en fonction de la pression de prédation observée l'été sur les ruches et des remontées des apiculteurs en matière de perte de colonies, tel que prévu parmi les indicateurs de suivi du plan (surveillance évènementielle).

Modalités d'évaluation de la pression de prédation* :

- Niveau faible : 1 frelon asiatique devant chaque ruche ;
- Niveau moyen : 1 à 3 frelons asiatiques devant chaque ruche ;
- Niveau fort : plus de 3 frelons asiatiques devant chaque ruche.

LA LUTTE COORDONNEE

- Seul nous n'y arriverons pas
- Tous ensemble est un gage de réussite

(comme pour la dératisation)

- En mettre un peu partout mêmes aux endroits où ils ne sont pas présents
- Piéger en respectant les dates et autres espèces

- 2024 moins de frelon a cause d'un mauvais printemps !

Il faut agir ce printemps 2025 pour accentuer la pression sur les fondatrices

Les mesures de lutte sont les suivantes :

Mesures	Période de mise en oeuvre	Objectifs visés
Détection et destruction des nids	Du printemps à l'automne	Protection des populations et de la biodiversité et des ruchers
Piégeage des fondatrices au printemps	Printemps	Protection des ruchers et de la biodiversité
Piégeage d'automne, muselières, harpes (outils de réduction du stress des colonies d'abeilles)	Automne	

L'utilisation relative des différents outils est à raisonner en fonction de la densité de frelon dans la zone considérée*.

Piégeage de printemps

Piégeage de printemps

Les dates et la durée du piégeage qui sont à adapter en fonction du climat local (2 mois à partir de février), plusieurs jours à plus de 12 degrés

Si vous souhaitez participer au suivi du plan national il faudra enregistrer


- L'identité et l'adresse du piégeur ;
- Le nombre d'individus capturés ;
- La distinction entre frelons asiatiques, frelons européens (espèce qui apparaît fin avril début mai) et espèces non-cibles ;
- Le lieu où le piège était positionné ;
- La nature de l'appât utilisé ;
- La durée du piégeage.

Outils de réduction du stress des colonies d'abeilles (automne)

- Les muselières,
- Les harpes électriques,
- Les restrictions d'entrée,
- Le piégeage d'automne.

Bonnes pratiques pour un piégeage de printemps efficace

L'objectif du piégeage de printemps est de faire baisser la pression de prédation sur les ruchers, en limitant l'implantation des nids à proximité.



Pendant une période de 2 mois maximum à partir de début février et jusqu'à fin mai, à adapter en fonction du secteur géographique (différences entre Nord et Sud de la France).

Débuter le piégeage

selon le climat local et en fonction des premières floraisons de printemps, après les dernières gelées quand les températures atteignent des valeurs supérieures à 12 degrés.

Combien de temps ?

Le piégeage sur une zone doit être effectif pendant au moins 4 ans.

Bonnes pratiques pour un piégeage de printemps efficace

Combien et où installer les pièges ?

Dans les zones peu infestées :

- Cible : les ruchers où l'on a observé de la prédation ou la présence de nids
- Mise en œuvre d'une surveillance minimale dans ces ruchers ou à proximité : 1 piège dans le rucher et 1 piège près des fleurs attractives (Camélia par exemple).

Dans les zones où la pression est importante :

- Placer 4 à 10 pièges par commune (à adapter en fonction du nombre de nids découverts

l'année précédente, et du type de milieu, rural ou urbain) près des fleurs attractives :

- o A proximité des ruchers impactés ;
- o A proximité des lieux où des nids ont été détectés.

Avec quels pièges ?

Les pièges doivent être les plus sélectifs possibles. Dans le cadre du plan national frelon (PNF), les pièges utilisés doivent être des pièges référencés, qui sont des pièges à sélection physique de type nasses, équipés de cônes d'entrée, avec une séparation entre l'appât et la partie de captures afin de retenir les fondatrices et ouvrières en laissant échapper un maximum d'espèces non-cibles.

Il s'agit à ce jour des pièges de printemps suivants :

- Le piège japonais ;
- Le piège coréen à ailes ;
- **Le piège nasse à grilles Néoppi jaunes.**
- **jabeprode**



Prix 12 €
5 Avec 10 appats



Prix 4 €

Prix 15 € les deux cônes

ATTENTION : Les pièges de type « bouteille » ou « cloche » ou « bocaux » sont interdits dans le cadre du plan frelon : leur sélectivité est très mauvaise même avec des adaptations, et leur impact sur le reste de l'entomofaune est trop important

Piège bouteille seulement de février au 30 avril car partiellement sélectif avec trou de sortie de 10mm

Pièges selectif



Piège nasse à grilles Néoppi jaunes



rucher école du carla 81

Piège Japonais

Avec quel appât ?

Trois appâts sucrés classiques sont très efficaces :

- 1/3 sirop fruit rouge + 1/3 bière + 1/3 vin rouge
- 2l eau + 1 kg sucre + 30g de levure de boulanger (fermentation pendant 3 jours), puis ½ l de vin rouge
- jus de pomme.

ou produits du commerce

Remarques : le choix de ces appâts est le suivant :

- La bière, ou la levure, pour la fermentation qui favorise la dispersion de l'odeur du sucre.
- Le sirop, pour le sucre nécessaire à la nourriture des larves de frelon asiatique. Ce sirop peut-être avantageusement remplacé par du sirop de nourrissage des abeilles (plus appétent).
- Le vin rouge ou blanc , répulsif pour les abeilles.

Eviter les brèches de cires et le miel pour des raisons sanitaires, même si un grillage protège l'appât.

Renouveler l'appât au plus tous les 8-10 jours, en laissant quelques frelons vivants à l'intérieur du piège, les phéromones attirent les frelons et repousseraient les autres insectes.

Appâts sucrés à privilégier au printemps

- Cocktail sucré = 1/3 bière + 1/3 de vin rouge + 1/3 sirop de fruits rouges (ou sirop de nourrissage) et ajouter du jus de fonte de cires
- 2l eau + 1 kg sucre + 30g de levure de boulanger (fermentation pendant 3 jours), puis ½ l de vin rouge)
- jus de pomme.

Ne pas vider complètement le piège et laisser des frelons vivants dedans (phéromones)

- Des produits existent aussi en dose individuelle ou en volume



7 règles pour installer et gérer mon piège

- 1. Au soleil**, avec des pièges nasses, équipés de cônes d'entrée, avec une séparation entre l'appât et la partie de captures (pièges référencés dans le cadre du plan national) ;
- 2. À côté d'une source de nourriture** (fleurs printanières, arbres et arbustes mellifères en fleur...) **ou d'une source d'eau, à proximité des anciens nids** ou des ruchers impactés. Ne pas hésiter à déplacer le piège en fonction de la floraison
- 3. Entre 1,20 m à 1,50 m du sol** environ (pour protéger les enfants et pouvoir surveiller le piège)
- 4. Orientation** de la grille latérale Sud / Sud-Est ;
- 5. Légère inclinaison** vers l'avant pour l'évacuation de l'eau ;
- 6. Placement de l'appât à l'intérieur du piège et renouvellement** tous les 8-10 jours
- 7. Si vous devez vider le piège** : le placer de préférence **1 heure au congélateur** ou noyer le piège dans l'eau (remettre quelques frelons intacts dans le piège).

APICULTEURS La protection des colonies

Outils de réduction du stress des colonies

Les outils de protection des colonies sont les outils les plus efficaces pour réduire le stress des colonies. L'idéal est de les associer. Tous les ruchers doivent être équipés avec plusieurs systèmes complémentaires : des restrictions d'entrée, avec des muselières et des harpes électriques.

Restrictions d'entrée

A mettre en place en octobre. Choisir les plus étroites (barres vertes). Il s'agit d'empêcher les entrées massives de frelon dans les ruches, après la floraison du lierre.

Associer obligatoirement avec harpes et muselières

Les muselières

Moyen efficace de protection des colonies. Différents types de muselières sont utilisables : grillagées ou à tube.

Les tubes peuvent être équipés de grilles qui empêchent les frelons d'entrer.



De nombreux modèles existent et peuvent être fabriqués par les apiculteurs.

Tension appliquée
de 3000 à 4000V

Condensateur
0,5 μ F

Energie Disponible
3 à 5 Joules

Electrocution Directe



rucher ecole du carla 81



Les harpes électriques

A utiliser en complément des muselières et restrictions d'entrée. Les harpes suppriment le stress en 8 jours après leur mise en place.

Placer aux extrémités d'un alignement de ruches, une harpe pour 5 ruches, perpendiculairement à la ligne de ruches.

Faire un couloir avec un grillage situé 1 mètre devant les ruches pour canaliser le vol des frelons. Enlever les frelons régulièrement pour éviter de changer l'eau qui doit contenir un répulsif pour les abeilles et autres insectes (liquide vaisselle citronné).

Utiliser de préférence les harpes humides avec batteries ou panneaux solaires.

De nombreux modèles existent et de nombreux apiculteurs en fabriquent (sites spécialisés avec plans de fabrication).

Efficacité : jusqu'à 200 frelons par jour.

Tentes grillagées

Chaque ruche ou un ensemble de ruches est entourés totalement de grillages pour éloigner les frelons de la planche d'envol, ce qui supprime le stress.

STRATÉGIE ET PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE À PATTES JAUNES

L'utilisation d'appâts de viande ou poisson imbibés d'insecticides est formellement interdit.

Les frelons qui reviennent au nid disséminent alors des insecticides très toxiques dans la nature.

Idem avec les billes de paintball aux insecticides qui manquent leur cible 😞

Les pièges sélectifs : utiliser les pièges référencés Lors de fortes pressions de prédation sur les ruchers, de nombreux pièges sont efficaces.

Structures ayant contribué à la rédaction du plan national de lutte 2022, base de travail pour l'élaboration de ce plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes :



**FNOSAD-LSA,
LA SANTÉ DE L'ABEILLE**
Fédération Nationale
des Organisations Sanitaires
Apicoles Départementales





LeFrelon.

Site gratuit pour indiquer la localisation des nids

Indiquez la position géographique du nid (ou des insectes)


- Commencez par saisir un code postal et choisissez la ville dans la liste qui apparaît.
- Ou bien vous pouvez zoomer, déplacer, cliquer sur la carte pour remplir automatiquement l'adresse.
- Encore mieux si vous êtes sur un smartphone, cliquez sur le **bouton de géolocalisation** à droite sur la carte 📍.

Code postal *

Ville / Commune *

Adresse

Département




Construire ses pièges ou en acheter



Lutte contre le frelon asiatique

Nos solutions de piégeage pour protéger vos ruches !



Je m'équipe →



rucher ecole du carla 81

Apiculture
REMUAUX

3 avenue André-Jacques Boussac
81160 Saint-Juéry
05 63 45 01 29

1 Couper le goulot de la **bouteille n° 1**



3 Avec la perceuse munie d'un foret de 5 mm, percer le fond de la bouteille



2 Enfoncer le goulot dans le corps de la bouteille



5 Enfoncer le culot de la **bouteille n° 1** dans celui de la **bouteille n° 2**

5



4 Couper le culot de la **bouteille n° 2**




6 Faire des trous autour de la **bouteille n° 1**



Maintenir le couvercle et créer une attache pour suspendre le piège

7 suspendre le piège





Accrocher
à une branche



3 trous d'1 cm
suffisent

Bière blonde


Cassis

Vin blanc

- 100 ml de bière blonde
- 100 ml de vin blanc (à ne pas oublier, car le vin blanc repousse les abeilles)
- 100 ml de sirop de cassis
- Mélanger ces trois liquides.
- Percez des trous de la taille du corps d'un frelon (1 cm de diamètre) dans le haut de la bouteille comme sur la photo.
- Suspendez ces pièges dans un arbre ou mettez-les au milieu d'un pot de fleurs.



POUR LA DESTRUCTION DES NIDS CONTACTEZ UN APICULTEUR AGREE POUR LA DESINSECTISATION
EQUIPE DE PERCHE ET AYANT L'AGREMENT BIOCIDES
NOUS VOUS PROPOSONS PHILIPPE DELATTRE 07 81 18 20 80



Exemple d'opération locale possible a développer sensibilisez vos voisins Amis Elus pour être plus efficace

PLAN NATIONAL ANTI FRELON



Piégeages des frelons a pattes jaunes


OPERATION DE FABRICATION DE PIEGES A FRELONS ASIATIQUES

au BAR'OUFF de ROUFFIAC 81

Vendredi 21 février de 16 H jusqu'à 20 h

Dimanche 23 février de 9h a 12 h

Horaires libres selon vos disponibilités



D'ici là vous pouvez récupérer des bouteilles plastiques vides

d'un litre de type eau gazeuse ou soda ou bidon plastique de 5 litres

Et les déposer dans le contenant prévu a cet effet a côté du poids public

De mars a fin mai : 1 pot de miel offert

pour tout signalement de nid primaire sur la commune

Taille d'une orange , inspectez vos cabanes de jardin , cabanes d'enfants , avancée de toitures , bâtiments vides

rucher ecole du carla 81

Exemple d'opération locale possible a développer
sensibilisez vos voisins Amis Elus pour être plus efficace

Piégeage des frelons asiatiques



Vous aimez les fruits et la biodiversité, Vous avez subi des dégâts sur vos fruitiers, vous aimez les abeilles et leur miel. Vous avez cet été observé la présence de frelons et vu leurs nids dans les arbres sur la commune. Il est important de limiter leur propagation Nous pouvons agir très utilement et individuellement contre ce fléau. Vous êtes invités à une réunion d'information et de sensibilisation

le vendredi 4 avril à 18h30 Salle de convivialité du Pastel

Chaque personne présente recevra un piège en cadeau. Si des personnes sont intéressées par la fabrication de pièges, un atelier sera organisé ultérieurement.

Exemple d'opération locale possible a développer

sensibilisez vos voisins Amis Elus pour être plus efficace

Le Tarn libre

Frelon asiatique : c'est le bon moment pour agir

Laurence Texeira · Modifié le : 10/03/2025 · Publié le : 10/03/2025 · 11 lecture minimum



Avec le retour des beaux jours, les reines de frelons asiatiques sortent de leur hibernation. Et c'est maintenant qu'il faut intervenir : piéger les reines fondatrices évite qu'elles ne fondent de nouvelles colonies.

LA DÉPÊCHE

Une forte mobilisation contre les frelons ...

Les frelons asiatiques sont déjà de retour, l'heure est au ...

« Il faut agir maintenant en piégeant intelligemment »

Publié le 21/03/2025 à 12:38 ,

La trêve hivernale est terminée... Voici le retour, comme chaque année, du frelon asiatique, dont la prolifération met en danger les abeilles, en ravageant les ruches par centaines. Outre la pénurie possible de miel, c'est tout le vivant qui est menacé, puisque les hyménoptères (le nom savant des abeilles) sont aussi, et peut-être surtout, des agents pollinisateurs essentiels pour la flore et la biodiversité. D'où la nécessité de "contenir" les populations de frelons asiatiques.

Merci pour votre attention